

19° Congresso Nazionale SOPSI

Milano, 23-26 febbraio 2015 - MiCo - Milano Congressi

Visualizza l'abstract inviato.

Dr. FILIPPO CASTELLANO (FILIPPO.CASTELLANO@GMAIL.COM)

SOPSI-ABS-3168-90-60646-20141018113158

Stampa

Chiudi

- In questa pagina vengono riproposti tutti i dati inseriti nelle sezioni precedenti.
- **Verificare attentamente l'esattezza di quanto inserito, in particolar modo nel titolo e nel body dell'abstract con riferimento a simboli, lettere greche e immagine.**
- In caso di utilizzo un browser diverso da Internet Explorer per Windows, per l'inserimento dei simboli con l'apposita tastiera o di un'immagine, verificare che tutto risulti posizionato in modo corretto, altrimenti tornare nella pagina precedente e utilizza le funzioni taglia (ctrl + X) e incolla (ctrl + V) per spostare manualmente quanto necessario.
- **Se tutto è corretto premere il tasto Avanti per confermare la registrazione dell'Abstract.**

Risposta dalla Segreteria Scientifica :

Stato : Processed
Ricevuto il : 18/10/2014 (gg/mm/aaaa)
Valutazione : ACCETTATO COME POSTER

Se l'abstract sarà accettato, la presentazione avverrà come segue.

Data presentazione :

Dalle ore :

Alle ore :

Dove :

Sala :

Durante la sessione :

Note dalla Segreteria Scientifica :

Note tecniche :

Vincoli :

Altre informazioni :

Ora inizio intervento :

Ora fine intervento :

Durata Intervento : 0

Durata Discussione : 0

Data di nascita del Presenting:
20/04/1980

Elenco autori :

	Titolo	Iniziale del nome	Cognome	Numero/i di Affiliazione	Presentatore
1.	Dr.	F.	CASTELLANO	1	Si
2.	Dr.	A.	LAX	1	
3.	Dr.	G.	GAMBA	1	
4.	Dr.	J.	SANTAMBROGIO	1	
5.	Dr.	M.	TREMOLADA	1	
6.	Dr.	A.	ROSSETTI	1	
7.	Dr.	F.	AMIDANI	1	
8.	Dr.	E.	CAPUZZI	2	
9.	Dr.	C.	CROCAMO	2	

10.	Dr.	R.	NAVA	2
11.	Dr.	G.	CARRA'	2
12.	Prof.	C.	PAPAGNO	3
13.	Prof.	M.	CLERICI	1

Elenco Affiliazioni :

Istituto	Città	Paese
1. Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale - Università degli Studi di Milano Bicocca	Monza	ITALY
2. Dipartimento di Salute Mentale, U.O. di Psichiatria, Azienda Ospedaliera San Gerardo	Monza	ITALY
3. Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Milano Bicocca	Milano	ITALY

Categoria dell'Abstract :

Abuso di sostanze

Titolo dell'abstract :

FACIAL EMOTION PERCEPTION (FEP) E DISORGANIZZAZIONE IN SOGGETTI AFFETTI DA SCHIZOFRENIA E SUBSTANCE USE DISORDER (SUD)

Testo dell'Abstract :

INTRODUZIONE: La Schizofrenia è una patologia cronica caratterizzata dalla presenza di sintomi positivi, negativi, disorganizzazione del pensiero e del comportamento con una progressiva compromissione delle funzioni socio-cognitive(1). In particolare, il deficit nel riconoscimento delle emozioni può rappresentare uno degli aspetti più gravi alla base dei problemi interpersonali dei soggetti affetti da schizofrenia(2). Inoltre questi pazienti presentano spesso in comorbidità una condizione di abuso di alcol e sostanze(3).

SCOPO DEL LAVORO: confrontare la FEP in pazienti affetti da Schizofrenia che utilizzano sostanze (SKZ+SUD) rispetto agli schizofrenici senza SUD in comorbidità (SKZ-SUD).

Materiali e Metodi: si tratta di uno studio descrittivo-osservazionale. Sono stati reclutati 53 soggetti (M=40; F=13) con diagnosi di Schizofrenia secondo il DSM-IV (valutata attraverso la Structured Clinical Interview for DSM-IV, SCID I). Il campione è stato suddiviso a seconda della presenza o meno dell'abuso di alcol e sostanze correlato (valutato con l'Alcohol e la Drug Use Scale -AUS e DUS- in due gruppi, che sono stati poi confrontati per quanto riguarda le caratteristiche socio-demografiche e cliniche (Positive and Negative Syndrome Scale -PANSS- e derivati indici di Bell: sintomi positivi, negativi e disorganizzazione). E' stata analizzata quindi l'associazione tra condizione di abuso e risultati ottenuti al test di Ekman, che valuta la FEP, controllando per variabili socio-demografiche e cliniche.

RISULTATI: I due gruppi SKZ+SUD (n=20; M=16, F=4) e SKZ-SUD (n=33; M=24, F=9) presentano una differenza statisticamente significativa per età con media (SD) pari a 38,4 (10,5) negli abusatori e 46,0 (8,7) nei non abusatori (p= 0,006) e per pendenze legali (p=0,03). Al test di Ekman il gruppo degli abusatori (media=43,1; SD=6,9) mostra un punteggio statisticamente più alto (p=0,006) rispetto ai non abusatori (media=34,6; SD=12,0). La differenza di punteggio è risultata più evidente nel confronto con i poliabusatori (44,94±7,05 vs 34,6±12,04; p=0.002). E' stato inoltre osservato il ruolo della disorganizzazione idetico-comportamentale come mediatore della relazione tra condizione di abuso e punteggio al riconoscimento facciale (p=0,017). La proporzione dell'effetto di abuso sul punteggio del test di Ekman, mediato dalla disorganizzazione, è risultato pari al 48%.

CONCLUSIONI: Nei soggetti affetti da schizofrenia la FEP sembra essere meno compromessa negli abusatori rispetto ai non abusatori. Emerge inoltre un importante ruolo della disorganizzazione idetico-comportamentale come mediatore tra SKZ+SUD e FEP.

1) Kohler, C. G., Walker, J. B., Martin, E. A., Healey, K. M., & Moberg, P. J. (2009). Facial emotion perception in schizophrenia: a meta-analytic review. *Schizophrenia bulletin*, sbn192.

2) Edwards, J., Jackson, H. J., & Pattison, P. E. (2002). Emotion recognition via facial expression and affective prosody in schizophrenia: a methodological review. *Clinical psychology review*, 22(6), 789-832.

3) Green, A., Drake, R., Brunette, M., & Noordsy, D. (2007). Schizophrenia and co-occurring substance use disorder. *American Journal of Psychiatry*, 164(3), 402-408.

Stampa

Chiudi

Per ulteriori informazioni contattate: AIM Group International - Milan Office - Via G. Ripamonti 129 - 20141 Milan, Italy
Tel. +39.0256601.1 - Fax +39.0256609045 - E-mail: sopsi2015.abstract@aimgroup.eu